

Antigén gyorseszteszt mintavételhez szükséges feltételek

Mintavétel helye:

A kialakított mintavételi helyeken történhet. A mintavételezést az erre a célra kijelölt helyiségben kell elvégezni, ami az orvosi rendelő általános feltételeinek megfelel. Az egészségügyi veszélyes hulladék elszállítására vonatkozóan szerződéssel kell rendelkezni. Leginkább javasolt meglévő szakrendelő elkülönített, erre kijelölt helyiségében, vagy más erre alkalmas helyiségben.

A mintavétel egyéb személyi és tárgyi feltételei:

A mintavételt bármilyen egészségügyi végzettséggel rendelkező személy elvégezheti, aki a mintavételezésre vonatkozó, NNK által összeállított oktatóanyagot, valamint a mintavételezésre vonatkozó szabályokat megismerte. Az oktatóanyag megismerését dokumentálni kell.

Az oktatóvideó az alábbi linken érhető el:

<https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/673-orr-garat-mintavetel-folyamata>

A mintavételt végző személyek az alábbi szakszerűen felvett, megfelelően illeszkedő egyéni védőfelszereléseket viseli:

- FFP2 respirátor
- védőszemüveg vagy arcvédő
- egyszerhasználatos gumikesztyű
- védőruha, vagy köpeny (hosszú ujjú, egyszerhasználatos, vízlepergető anyagú)
- sebészi műtős sapka (egyszer használatos)

Abban az esetben, ha több mintavétel történik, az adminisztrációt célszerű, ha másik személy végzi. Higiénés kézfertőtlenítő biztosítása szükséges!

Antigén gyorseszteszt alkalmazása:

A gyorsesztesztre rá kell írni a személy nevét. Az egyik orrnyíláson keresztül a gyorseszteszthez mellékelt mintavevővel mintavételt kell végezni. Ezt követően a gyorseszteszt használati utasítása szerint szükséges elvégezni a vizsgálatot.

Az eredményt leolvasó személy az eredményt rögzíti a vizsgálati dokumentációban és aláírásával igazolja azt, vagy fotódokumentumot készít a

A mintavételi pálcát a használat után egészségügyi veszélyes hulladékként kell kezelni.

Mind a pozitív, mind a negatív Antigén gyorseszteszt eredményt az egészségügyi adatkezelés szabályai szerint rögzíteni szükséges leolvasást végző egészségügyi szolgáltatónak az EESZT rendszerében.

A pozitív eredmények rögzítésre kell, hogy kerüljenek az OSZIR fertőző beteg bejelentő alrendszerébe is, vagy hitelt érdemlően el kell juttatni a háziorvos részére.

A további teendők a személy vonatkozásában az eredménytől, a klinikai tünetek meglététől, vagy hiányától és az epidemiológiai kapcsolattól függően kerülnek meghatározásra. Ezeket külön rögzítjük.